

**BIJLAGE I**

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN**

## 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Canishield 1.04 g halsband voor grote honden

## 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per halsband van 65 cm (26 g):

### Werkzaam bestanddeel:

Deltamethrin 1.04 g

### Hulpstoffen:

Kwalitatieve samenstelling van hulpstoffen en andere bestanddelen
Carbon zwart
Geëpoxydeerde sojaolie
Diisonyl adipaat
Trifenyfosfaat
Polyvinylchloride
Calciumstearaat
Zinkstearaat
Stearinezuur

Zwarte medicinale halsband waar wit poeder uit vrijkomt.

## 3. KLINISCHE GEGEVENS

### 3.1 Doeldiersoort(en)

Hond

### 3.2 Indicaties voor gebruik voor elke doeldiersoort

Het diergeneesmiddel heeft een:

- persisterende dodende werking tegen vlooien (*Ctenocephalides felis*) gedurende 16 weken;
- persisterende dodende werking tegen teken (*Ixodes ricinus*) gedurende 6 maanden;
- dodende en afwerende werking tegen zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5,5 maanden.

### 3.3 Contra-indicaties

Niet gebruiken bij pups jonger dan 7 weken.

Niet gebruiken bij honden met huidlaesies.

Niet gebruiken bij honden met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Niet gebruiken bij katten; deltamethrin is schadelijk voor katten.

### 3.4 Speciale waarschuwingen

Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt, dient de halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie te worden aangebracht.

Teken en zandvliegen zullen respectievelijk binnen 48 en 24 uur gedood worden en van de gastheer afvallen, zonder een bloedmaaltijd te nuttigen. Na de behandeling kan de hechting van enkele teken of de beet van enkele zandvliegen niet worden uitgesloten. Om deze reden kan overdracht van infectieziekten door teken of zandvliegen niet volledig worden uitgesloten als de omstandigheden ongunstig zijn.

Voor een optimale controle van vlooiëninfestaties in huishoudens met meerdere huisdieren, moeten alle honden in het huishouden gelijktijdig behandeld worden.

Vlooiën van huisdieren bevinden zich vaak ook in de manden, bekleding en de gebruikelijke rustplaatsen, zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze dienen dan ook in geval van een massale vlooiëninfestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen behandeld te worden met een geschikt insecticide en door regelmatig stofzuigen.

De invloed van baden en wassen met shampoo op de duur van de werkzaamheid is niet onderzocht. Incidenteel contact met water vermindert de effectiviteit van de halsband niet.

Onnodig gebruik van antiparasitaire middelen of gebruik dat afwijkt van de instructies in de SPC kan de resistentieselectiedruk verhogen en een verminderde werkzaamheid tot gevolg hebben. De beslissing om het diergeneesmiddel te gebruiken dient te worden gebaseerd op bevestiging van de soort parasiet en de last, of van het risico op infestatie op basis van de epidemiologische kenmerken, voor elke individuele hond.

Resistentie voor pyrethroïden en in het bijzonder voor deltamethrin is gemeld bij vlooiën (*C. felis*) en teken (*Rhipicephalus sanguineus*) bij honden. Bij gebruik van dit diergeneesmiddel moet rekening worden gehouden met lokale informatie over de gevoeligheid van de doelparasieten, indien beschikbaar.

### 3.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoort(en):

In geval van huidlaesies de halsband verwijderen totdat de symptomen zijn verdwenen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Accidentele inname van dit diergeneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken, waaronder neurotoxische effecten.

Bewaar de halsband in de sachet tot gebruik. Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen van de halsband. Vermijd dat kinderen met de halsband spelen of in hun mond stoppen. Gooi eventuele resten of afgesneden stukken van de halsband onmiddellijk weg. Was de handen met koud water na het aanbrengen van de halsband.

Vermijd langdurig contact met de halsband of de hond die de halsband draagt. Laat dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaren, in het bijzonder niet bij kinderen.

In geval van accidentele orale blootstelling of inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Deltamethrin kan

overgevoeligheidsreacties (of allergische reacties) veroorzaken bij gevoelige personen. Personen met

een bekende overgevoeligheid voor deltamethrin moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Als allergische reactie optreedt, zoek dan medisch advies.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu:

Deltamethrin is giftig voor water organismen. Voorkom dat honden die de halsband dragen oppervlaktewater betreden.

### 3.6 Bijwerkingen

Hond

Zelden (1 tot 10 dieren/10.000 behandelde dieren):	Lokale huidreacties (jeuk, erytheem, haaruitval) <sup>1</sup> ,
Zeer zelden (<1 dier/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen):	Afwijkend gedrag (lethargie, hyperactiviteit) <sup>2</sup> , Gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie), Neuromusculaire problemen (zoals ataxie, spiertremor) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> in de hals of van de huid in het algemeen

<sup>2</sup> vaak geassocieerd met huidirritatie

<sup>3</sup> de symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur na verwijdering van de halsband

Als een van deze symptomen optreedt, moet de halsband worden verwijderd en wordt geadviseerd contact op te nemen met een dierenarts.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. De meldingen moeten, bij voorkeur via een dierenarts, worden gestuurd naar ofwel de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, of zijn lokale vertegenwoordiger, ofwel de nationale bevoegde autoriteit via het nationale meldsysteem. Zie ook het einde van de bijsluiter voor de desbetreffende contactgegevens.

### 3.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht.

Dracht en lactatie:

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten-risicobeoordeling door de behandelende dierenarts. Uit laboratoriumonderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene of foetotoxische effecten.

### 3.8 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig gebruiken met andere ectoparasiticiden (pyrethroïden, organofosfaten).

### 3.9 Toedieningswegen en dosering

Cutaan gebruik. Eén halsband per hond om de nek bevestigen. Haal de halsband pas vlak voor aanbrengen uit het beschermende sacht. Bevestig de halsband rond de nek van het dier niet te los en niet te strak: houdt twee platte vingers ruimte tussen de halsband en de nek van de hond. Knip de overtollige gedeelte van de band af (ca. 5 cm voorbij de gesp). Controleer regelmatig of de band niet te strak of te los zit en pas indien nodig de lengte aan door de gesp in te knijpen en de band in de juiste positie te schuiven.



### **3.10 Symptomen van overdosering (en, in voorkomend geval, spoedbehandeling en tegengiffen)**

In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband zou opeten kunnen de volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, tremoren, hypersalivatie (overmatig speeksel), braken, stijfheid van de achterhand. Deze symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur.

Voor meer informatie over symptomatische behandeling wordt geadviseerd contact op te nemen met uw dierenarts.

### **3.11 Speciale beperkingen op het gebruik en speciale voorwaarden voor het gebruik, met inbegrip van beperkingen op het gebruik van antimicrobiële en antiparasitaire diergeneesmiddelen om het risico op ontwikkeling van resistentie te beperken**

Niet van toepassing.

### **3.12 Wachtijd(en)**

Niet van toepassing.

## **4. FARMACOLOGISCHE GEGEVENS**

### **4.1 ATCvet-code: QP53AC11**

### **4.2 Farmacodynamische eigenschappen**

Deltamethrin is een ectoparasiticide uit de klasse van de pyrethroïden. Insecten en acarinen worden aan deltamethrin blootgesteld door contact. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op een aanhoudende toename van de natriumpermeabiliteit van de zenuwmembranen van insecten en acarinen. Dit resulteert in hyperactiviteit gevolgd door verlamming (Knock-down effect), tremor en de dood van de parasiet.

### **4.3 Farmacokinetische eigenschappen**

Deltamethrin komt langzaam en continu vrij uit de halsband en komt zo terecht in de vacht van de hond. De werkzame stof verspreidt zich vanaf daar, over het hele huidoppervlak via de vetlaag van de huid en via de vacht. Deltamethrin wordt niet systemisch geabsorbeerd door de drager van de halsband.

## **5. FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

### **5.1 Belangrijke onverenigbaarheden**

Niet van toepassing.

### **5.2 Houdbaarheidstermijn**

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct gebruiken.

### **5.3 Bijzondere voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur. Bewaar de sachet(s) in de buitenverpakking.

### **5.4 Aard en samenstelling van de primaire verpakking**

Materiaal van de primaire verpakking:

PET/PE/aluminium/surlyn sachet, met daarin één halsband.

Verpakkingsgrootten:

Kartonnen doos met 1 of 2 halsbanden, individueel verpakt in kindveilige sachets.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### **5.5 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of afvalmateriaal voortkomend uit het gebruik van het diergeneesmiddel**

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Het diergeneesmiddel mag niet in het oppervlaktewater terechtkomen, aangezien deltamethrin gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen die op het desbetreffende diergeneesmiddel van toepassing zijn.

## **6. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Beaphar B.V.

## **7. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

REG NL 121300

## **8. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING**

Datum van eerste vergunningverlening: 13 augustus 2018.

## **9. DATUM VAN DE LAATSTE HERZIENING VAN DE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN**

23 augustus 2023

## **10. INDELING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Diergeneesmiddel vrij van voorschrift.

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar in de diergeneesmiddelenbank van de Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**BIJLAGE II**  
**ETIKETTERING EN BIJSLUITER**

**A. ETIKETTERING**



**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

**KARTONNEN DOOS**

**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Canishield 1.04 g halsband

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

Per halsband van 65 cm (26 g):

Deltamethrin ..... 1.04 g

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

1 halsband

2 halsbanden

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Honden (grote)

**5. INDICATIES**

Het diergeneesmiddel heeft een:

- persisterende dodende werking tegen vlooien (*Ctenocephalides felis*) gedurende 16 weken;
- persisterende dodende werking tegen teken (*Ixodes ricinus*) gedurende 6 maanden;
- dodende en afwerende werking tegen zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5,5 maanden.

**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Cutaan gebruik

**7. WACHTTIJD(EN)**

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur. Bewaar de sachet(s) in de buitenverpakking.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL  
BRENGEN**

**beaphar**

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

REG NL 121300

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD**

**Sachet**

**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Canishield halsband



1 x 65cm

**beaphar**

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Deltamethrin 1.04 g

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**B. BIJSLUITER**

## BIJSLUITER

### 1. Naam van het diergeneesmiddel

Canishield 1.04 g halsband voor grote honden

### 2. Samenstelling

Per halsband van 65 cm (26 g) :

Werkzaam bestanddeel: Deltamethrin 1.04 g

Zwarte medicinale halsband, waar wit poeder uit vrijkomt.

### 3. Doeldiersoort(en)

Hond

### 4. Indicaties voor gebruik

Het diergeneesmiddel heeft een:

- persisterende dodende werking tegen vlooiën (*Ctenocephalides felis*) gedurende 16 weken;
- persisterende dodende werking tegen teken (*Ixodes ricinus*) gedurende 6 maanden;
- dodende en afwerende werking tegen zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5,5 maanden.

### 5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij pups jonger dan 7 weken.

Niet gebruiken bij honden met huidlaesies.

Niet gebruiken bij honden met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, of één van de hulpstoffen.

Niet gebruiken bij katten; deltamethrin is schadelijk voor katten.

### 6. Speciale waarschuwingen

#### Speciale waarschuwingen:

Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt, moet de halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan vlooiën, teken en/of zandvliegen worden aangebracht.

Teken en zandvliegen zullen respectievelijk binnen 48 en 24 uur gedood worden en van de gastheer afvallen, zonder een bloedmaaltijd te hebben gehad.

Na de behandeling kan de hechting van enkele teken of de beet van enkele zandvliegen niet worden uitgesloten. Om deze reden kan overdracht van infectieziekten door teken of zandvliegen niet volledig worden uitgesloten als de omstandigheden ongunstig zijn.

Voor een optimale beheersing van vlooiëninfestaties in huishoudens met meerdere huisdieren, moeten alle honden in het huishouden gelijktijdig behandeld worden.

Vlooiën van huisdieren bevinden zich vaak ook in de manden, bekleding en de gebruikelijke rustplaatsen, zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze dienen dan ook in geval van een massale

vlooiëninfestatie en bij het begin van de bestrijdingsmaatregelen behandeld te worden met een geschikt insecticide en door regelmatig stofzuigen.

De invloed van baden en wassen met shampoo op de duur van de werkzaamheid is niet onderzocht. Incidenteel contact met water vermindert de effectiviteit van de halsband niet.

Onnodig gebruik van antiparasitaire middelen of gebruik dat afwijkt van de instructies in de bijsluiters kan de resistentieselectiedruk verhogen en een verminderde werkzaamheid tot gevolg hebben. De beslissing om het diergeneesmiddel te gebruiken dient te worden gebaseerd op bevestiging van de soort parasiet en de last, of van het risico op infestatie op basis van de epidemiologische kenmerken, voor elke individuele hond.

Resistentie voor pyrethroïden en in het bijzonder voor deltamethrin is gemeld bij vlooiën (*C. felis*) en teken (*Rhipicephalus sanguineus*) bij honden. Bij gebruik van dit diergeneesmiddel moet rekening worden gehouden met lokale informatie over de gevoeligheid van de doelparasieten, indien beschikbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoort(en):

In geval van huidlaesies de halsband verwijderen totdat de symptomen zijn verdwenen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Accidentele inname van dit diergeneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken, waaronder neurotoxische effecten.

Bewaar het diergeneesmiddel in de originele verpakking. Bewaar de halsband in de sachet tot gebruik. Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen van de halsband. Vermijd dat kinderen met de halsband spelen of in hun mond stoppen. Gooi eventuele resten of afgesneden stukken van de halsband onmiddellijk weg. Was de handen met koud water na het aanbrengen van de halsband.

Vermijd langdurig contact met de halsband of de hond die de halsband draagt. Laat dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaren, in het bijzonder niet bij kinderen. In geval van accidentele orale blootstelling of inname, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiters of het etiket te worden getoond.

Deltamethrin kan overgevoeligheidsreacties (of allergische reacties) veroorzaken bij gevoelige personen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor deltamethrin moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Als allergische reactie optreedt, zoek dan medisch advies.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu:

Deltamethrin is giftig voor water organismen. Voorkom dat honden die de halsband dragen oppervlaktewater betreden.

Dracht en lactatie:

Uit laboratoriumonderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op foetotoxische effecten of effecten op de ontwikkeling.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is echter niet vastgesteld bij drachtige honden.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten-risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet gelijktijdig gebruiken met andere ectoparasiticiden die organofosfaten bevatten.

Overdosering:

In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband zou opeten, kunnen de volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, tremor, overmatig speeksel, braken, stijfheid van de

achterhand. Deze symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur. Voor meer informatie over symptomatische behandeling wordt geadviseerd contact op te nemen met uw dierenarts.

**Belangrijke onverenigbaarheden:**

Niet van toepassing.

## 7. Bijwerkingen

Hond

Zelden (1 tot 10 dieren/10.000 behandelde dieren):	Lokale huidreacties (jeuk, erytheem, haaruitval). <sup>1</sup>
Zeer zelden (<1 dier/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen):	Afwijkend gedrag (lethargie, hyperactiviteit). <sup>2</sup> Gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie). Neuromusculaire problemen (zoals ataxie, spiertremor). <sup>3</sup>

<sup>1</sup> in de hals of van de huid in het algemeen

<sup>2</sup> vaak geassocieerd met huidirritatie

<sup>3</sup> de symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur na verwijdering van de halsband


Als een van deze symptomen optreedt, moet de halsband worden verwijderd en wordt geadviseerd contact op te nemen met een dierenarts.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiting worden vermeld, of u vermoedt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan in eerste instantie contact op met uw dierenarts. U kunt bijwerkingen ook melden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen met behulp van de contactgegevens aan het einde van deze bijsluiting of via uw nationale meldsysteem:

## 8. Dosering voor elke diersoort, toedieningswijzen en toedieningswegen

Cutaan gebruik. Eén halsband per hond om de nek bevestigen.

## 9. Aanwijzingen voor een juiste toediening



Haal de halsband pas vlak voor aanbrengen uit het beschermende sachet. Bevestig de halsband rond de nek van het dier niet te los en niet te strak: houdt twee platte vingers ruimte tussen de halsband en de nek van de hond. Knip het overtollige gedeelte van de band af (ca. 5cm voorbij de gesp). Controleer regelmatig of de band niet te strak of te los zit en pas indien nodig de lengte aan door de gesp in te knijpen en de band in de juiste positie te schuiven.

**10. Wachtijd(en)**

Niet van toepassing.

**11. Bijzondere bewaarvoorschriften**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaar de sachet(s) in de buitenverpakking.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct gebruiken.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos na Exp. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

**12. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen**

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Dit diergeneesmiddel mag niet in het oppervlaktewater terechtkomen, aangezien deltamethrin gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen die van toepassing zijn. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.

**13. Indeling van het diergeneesmiddel**

Diergeneesmiddel vrij van voorschrift.

**14. Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen en verpakkingsgrootten**

REG NL 121300

Verpakkingsgrootten:

Kartonnen doos met 1 of 2 kindveilige sachets

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

**15. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

23 augustus 2023

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar in de diergeneesmiddelendatabank van de Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).



## **16. Contactgegevens**

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

#### Houder van de vergunning:

Beaphar B.V.  
Drostenkamp 3  
8101 BX Raalte  
Nederland

#### Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Beaphar B.V  
Oude Linderteseweg 9  
8102 EV Raalte  
Nederland

### Lokale vertegenwoordigers en contactgegevens voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen:

Beaphar Nederland  
Baronieweg 7  
5321 JV Hedel  
Nederland  
T: 073 5998 600  
E-mail: [info@nl.beaphar.com](mailto:info@nl.beaphar.com)

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

## **17. Overige informatie**

<b>KANALISATIE</b> VRIJ
----------------------------